

桃園市政府衛生局新聞稿

發稿單位：疾病管制科

發布日期：104 年 3 月 20 日

聯絡人：林國甯科長

聯絡電話：03-3340935 轉 2100

聯絡行動：0978-308-972

紅火蟻叮咬後處理三步驟 --冰敷、不抓、快就醫

衛生局表示若遭紅火蟻咬傷目前沒有特殊解毒劑，主要為症狀治療，若症狀輕微，可用清水或肥皂水清潔，並自行在傷處冰敷，或在醫師的指示下，使用抗組織胺藥物、類固醇軟膏等藥物治療，若有水泡或膿泡請勿擠破，以免造成二次細菌感染變成蜂窩組織炎或留下癍痕化的傷口。如出現過敏性反應時，應立即就醫治療，以免危及生命。依據衛生局統計，去(103)年醫療院所共通報 4 例遭紅火蟻咬傷的病例，調查發現被咬傷的地點多來自田埂、公園及校園，患者經妥善治療後皆無大礙。

台灣火蟻有 4 種，除了原有 2 種原生的「獵食火蟻」與「知本火蟻」外，另 2 種為外來的「熱帶火蟻」及「入侵紅火蟻」，其中入侵紅火蟻是台灣外來種火蟻中最危險的螞蟻，原生地為南美洲，於 2003 年侵入台灣，由於此類紅火蟻毒液含有大量蟻酸及多種毒蛋白，咬傷後常會出現局部性膿泡，產生如蜂蟻般的劇烈灼熱感，皮膚亦會產生紅疹、皮膚癢及水泡；如果被大量的紅火蟻叮咬，毒素累積過量可導致局部組織壞死、溶血等嚴重併發症；部分體質敏感的人會因毒液中的水溶性毒蛋白，產生蕁麻疹、臉部、眼睛與喉嚨腫脹、胸痛、呼吸停止、說話困難模糊、麻痺及心臟病等過敏性反應，嚴重者會造成過敏性休克而死亡。

一般辨識入侵紅火蟻最簡單的就是從蟻巢中存有大小不同個體，用肉眼可看到蟻的前端紅褐色尾部黑(相關圖片可至 www.fireant.tw/ 資源下載/國家紅火蟻防治中心出版品項下下載)。衛生局提醒，在野外活動時若有可能出現紅火蟻的地區應著長袖衣服、長褲、鞋襪、戴帽子及手套，如發現蟻丘應立刻通報區公所農經課，千萬不要踢弄，以免驚動紅火蟻，遭蟻群叮咬。民眾如有相關問題，可撥打 1999 市民諮詢服務熱線。